

Cosas que debe saber sobre las Medicinas Sin Receta (MSR)

Siempre examine las “realidades de los medicamentos” con respecto a las medicinas que pueda comprar que no requiere receta. Si usted esta tomando más de una droga sin receta, compare los “ingredientes activos” en cada una para no recibir una doble o triple dosis. Lea las advertencias para asegurarse de que la medicina le funcionara, no actuara en contra de la suya. Examine cuidadosamente las indicaciones que le informan la dosis apropiada para adultos y niños. Las dosis para cada uno son diferentes. Si algo no está claro, consulte con su farmacéutico para que se lo explique.

Los químicos que tratan sus síntomas.

Categoría de medicina (como la antihistamina, antiácido, o supresor de la tos)

Cuándo no se debe usar el producto, cuándo debe dejar de tomarlo, cuándo debe ver a un doctor, y los posibles efectos secundarios.

Síntomas o enfermedades que este producto podrá tratar o prevenir.

Cuánto se debe tomar, cómo se debe tomar y por cuánto tiempo se debe tomar.

Cualquier otra información importante: cómo se debe guardar la medicina, o el contenido de sodio (sal)

Drug Facts	
Active ingredient (in each tablet)	Purpose
Chlorpheniramine maleate 2 mg	Antihistamine
Uses temporarily relieves these symptoms due to hay fever or other upper respiratory allergies: ■ sneezing ■ runny nose ■ itchy, watery eyes ■ itchy throat	
Warnings Ask a doctor before use if you have ■ glaucoma ■ a breathing problem such as emphysema or chronic bronchitis ■ trouble urinating due to an enlarged prostate gland Ask a doctor or pharmacist before use if you are taking tranquilizers or sedatives	
When using this product ■ drowsiness may occur ■ avoid alcoholic drinks ■ alcohol, sedatives, and tranquilizers may increase drowsiness ■ be careful when driving a motor vehicle or operating machinery ■ excitability may occur, especially in children	
If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use. Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.	
Directions	
adults and children 12 years and over	take 2 tablets every 4 to 6 hours; no more than 12 tablets in 24 hours
children 6 years to under 12 years	take 1 tablet every 4 to 6 hours; no more than 6 tablets in 24 hours
children under 6 years	ask a doctor
Other Information ■ store at 20-25° C (68-77° F) ■ protect from excessive moisture	
Inactive ingredients D&C yellow no. 10, lactose, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, pregelatinized starch	

Ingredientes no-medicinales, tal como los colores o sabor

Encuentre las respuestas leyendo las realidades de las medicinas.

1. ¿Cuál es el ingrediente activo en esta medicina? _____
2. Nombre tres síntomas que este ingrediente alivia: _____

3. ¿Se puede tomar esta medicina si tiene la presión alta? _____
4. ¿Esta medicina es aceptable para un niño de cuatro años? _____
5. ¿Qué debe hacer si toma demasiada de esta medicina? _____